

تقارن پنهان سیاه‌چاله چرخان سه بعدی

سعیده صادقیان

گروه فیزیک نظری، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

پست الکترونیکی: s.sadeghian@umz.ac.ir

چکیده:

در این پژوهش به تقارن‌های آشکار و پنهان فضا-زمان خمیده می‌پردازیم. این دو نوع تقارن آشکار و پنهان در این خاصیت که مولد آن‌ها در فضای فاز پیمایش گر، همان ثابت حرکت هستند، مشترک‌که هستند. تفاوت آن‌ها در این است که مولد تقارن پنهان از ادغام تانسور کیلینگ در دو یا تعدادی بیشتر از تکانه ذره بدست می‌آید، در حالی که برای تقارن آشکار، این مولد در تکانه ذره خطی است. بنابراین می‌توانیم از روی ثابت حرکت پیمایش گر یک فضا-زمان خمیده به تانسورهای کیلینگ آن فضا-زمان پی ببریم. تانسورهای کیلینگ هندسه‌های چهاربعدی و همچنین با ابعاد بالاتر قبلاً مطالعه شده‌اند. در این کار، ما به این سوال در مورد وجود تقارن پنهان در سیاه‌چاله چرخان سه بعدی، پاسخ می‌دهیم. برای این منظور، ما دو نوع پیمایش گر ذره آزاد و میدان اسکالر را مستقل از هم تحلیل می‌کنیم. با استفاده از ثابت حرکت مربوط به آن‌ها، نشان می‌دهیم که تانسور کیلینگ این سیاه‌چاله سه‌بعدی، بدیهی است.

واژه‌های کلیدی: تانسور کیلینگ، فضا-زمان خمیده، فضای فاز، میدان اسکالر

برای بردار \vec{v} بدست آورد. در اینجا منظور از پرانتر دور اندیس‌ها این است که عبارت باید به صورت تقارن نسبت به آن اندیس‌های داخل پرانتر نوشته شود. به وضوح، معادله $\partial_{\mu} \partial^{\mu} v^{\nu} = 0$ یک معادله دیفرانسیل جزئی مرتبه اول است و جواب آن، تحت عنوان بردار کیلینگ شناخته می‌شود. با اعمال یک دیفریمورفیزم در راستای بردار کیلینگ، متريک فضا-زمان ناوردا باقی می‌ماند. به عنوان مثال، اگر برای یک فضا-زمان، بردار $v^{\nu} = \partial^{\nu} x^{\mu}$ (که در پایه مختصاتی نوشته شده است)، بردار کیلینگ باشد، متريک آن دارای تقارن زمانی است. اين هندسه‌ها را تحت عنوان هندسه پایا می‌شناسیم.

تعمیم معادله ۰ برای تانسور مرتبه n -ام $K^{\mu_1 \dots \mu_n}$ ، به صورت $\nabla^{(\nu} K^{\mu_1 \dots \mu_n)} = 0$ ، (۲)

تقارن‌ها در فیزیک، به ساده‌سازی حل مسائل کمک می‌کنند. تعاریف مختلفی برای تقارن وجود دارد که در این کار ما با این تعریف از تقارن سروکار خواهیم داشت: نگاشتی در بین اعضای مجموعه جواب‌های یک معادله حرکت که یک جواب را به خودش یا به یک جواب دیگر می‌برد. در اینصورت ناوردادی تبدیل تقارنی، معادله حرکت حاکم بر آن جواب‌ها است. در گرانش نسبیتی که به مطالعه هندسه فضا-زمان‌های خمیده، میدان‌های روی آن و دینامیک آن‌ها می‌پردازد، تقارن‌های دقیق را می‌توان به طور مستقیم از حل معادله کیلینگ $\nabla^{(\mu} K^{\nu \dots \lambda)} = 0$ ، (۱)

^۱ تقارن دقیق در مقابل تقارن مجانبی به کار رفته است. برای تقارن مجانبی معادله کیلینگ به صورت تقریبی تا حدی که شرایط مزدی اجازه می‌دهند، برقرار است. در این کار به تقارن‌های مجانبی نمی‌پردازیم و در ادامه منظور ما از تقارن، تقارن دقیق است.

ایجاد می‌کند. این در حالی است که اعمال این تبدیل در فضای فاز، تغییراتی در مختصات به وجود می‌آورد که با توان اول (یا بالاتر) تکانه متناسب است. در نتیجه در تصویر کردن اثر آن روی فضای پیکربندی که ذره در آن حرکت می‌کند، نمودی ندارد. از این جهت به این‌گونه تقارن‌ها، تقارن‌های پنهان گفته می‌شود. در مقابل به تقارن‌هایی که متناظر با بردار کیلینگ هستند، تقارن آشکار می‌گویند. از بحث بالا، کاملاً روشی است که از ضرب تانسوری دو بردار کیلینگ، یک تانسور مرتبه دوم کیلینگ به دست می‌آید، اما این نوع تانسورها را بدیهی می‌نمایم زیرا به ثابت حرکت مستقلی از آن‌چه از بردار کیلینگ به دست می‌آید، منجر نمی‌شوند. یک تانسور کیلینگ بدیهی دیگر، خود متريک فضا-زمان است.

یادآوری می‌شود که اگر معادله پیمایش‌گر جدادشدنی باشد، وجود ثوابت مستقل به تعداد کافی (یعنی برابر با بعد فضا-زمان)، آن مسئله را حل پذیر می‌کند [۱]. به همین جهت، برای شمارش دقیق ثوابت حرکت، مطالعه تانسورهای کیلینگ غیربدیهی اهمیت می‌یابد. به عنوان مثال، در سیاه‌چاله چرخان کرّ چهاربعدی وجود تانسور کیلینگ غیربدیهی است که مسئله حرکت ذره آزاد را حل پذیر می‌کند [۲]. تانسورهای کیلینگ در سیاه‌چاله‌های با ابعاد بالاتر نیز مطالعه شده‌اند [۳]. در این کار، برای پی بردن به رفتارهای مشترک تقارن‌های پنهان در ابعاد مختلف، به مطالعه تقارن‌های پنهان در سه بعد می‌پردازیم تا درک بهتری از زوایای پنهان آن داشته باشیم. در سه بعد، تنها جواب سیاه‌چاله برای نظریه اینشتین خالص با ثابت کیهانی منفی، سیاه‌چاله BTZ نامیده می‌شود [۴]. آهنگ واپاشی این سیاه‌چاله به میدان اسکالری که به صورت کمینه با آن برهم‌کنش دارد، در چارچوب گرانش و همچنین نظریه میدان همدیس دوگان مطالعه شده است [۵]. در اینجا، از دیدگاه تقارن‌های پنهان به این مسئله می‌پردازیم و وجود تانسور کیلینگ غیربدیهی برای این سیاه‌چاله چرخان سه‌بعدی را تحقیق می‌کنیم. برای این منظور ابتدا پیمایش‌گر ذره آزاد را بررسی می‌نماییم. سپس میدان اسکالری که در معادله کلاین-گوردون جرم‌دار صدق می‌کند را به عنوان پیمایش‌گر این فضا-زمان

نوشته می‌شود. جواب این معادله را تحت عنوان تانسور کیلینگ می‌شناسم. اگرچه هنوز اثر تقارنی تانسور کیلینگ روی هندسه، به خوبی شناخته نشده است، در ادامه مفهوم تقارنی تانسور کیلینگ را شرح می‌دهیم.

یک روش دیگر برای یافتن تقارن‌های یک فضا-زمان خمیده، کمک گرفتن از پیمایش‌گرها مختلف از جمله ذره آزاد، میدان اسکالر یا میدان‌های با اسپین بالاتر که به طور کمینه با گرانش جفت شده‌اند، است. زیرا تقارن‌های فضا-زمان در دینامیک این پیمایش‌گرها نمود پیدا می‌کند. هر یک از این پیمایش‌گرها در معادله حرکت مخصوص به خود صدق می‌کند. در نتیجه برای هر پیمایش‌گر می‌توان فضای فاز جواب‌های معادله حرکت را ساخت. به عنوان مثال، فضای فاز برای ذره آزاد که روی فضا-زمان خمیده حرکت می‌کند، همان فضای کانتزانت مربوط به خمینه است. هر تبدیلی در این فضای فاز، یک تقارن است زیرا جواب را به جواب می‌برد. تحول زمانی ذره نیز با هامیلتونی آن داده می‌شود. ثوابت حرکت ذره، یعنی توابعی که تحت تحول زمانی ثابت هستند، به تقارن‌های فضا-زمان مربوط می‌شوند. اگر خمینه‌ای که ذره روی آن حرکت می‌کند دارای بردار کیلینگ \mathbf{C} باشد، می‌توان نشان داد که تابع زیر یکی از ثوابت حرکت آن است،

$$(3) \quad C^\mu_{\nu} p_\mu = 0.$$

در اینجا p_μ معرف تکانه ذره است. به عنوان نمونه، برای ذره‌ای که روی فضا-زمان پایا حرکت می‌کند، انرژی ذره، یک ثابت حرکت است.

ممکن است ثابت حرکت، از توان دوم تکانه (یا توان‌های بالاتر تکانه)، ساخته شود. برای این‌که اندیس‌های این تعداد تکانه آزاد نباشد، باید آن‌ها را با تانسور مرتبه دوم (یا مرتبه بالاتر) ادغام نماییم. در این صورت شرط این‌که تابع C_K که به صورت $C_K = K^{\mu_1 \dots \mu_n} p_{\mu_1} \dots p_{\mu_n}$ ،

تعريف می‌شود، ثابت حرکت باشد، این است که در معادله کیلینگ ۰ صدق کند. به عبارت دیگر، تابع C_K که از روی تانسور کیلینگ ساخته می‌شود، در فضای فاز ذره، تبدیل تقارنی

¹ Probe

² Kerr

$$p_r = \sqrt{\frac{(C_T - \Omega C_\varphi)^2}{f^2} - \frac{p_\varphi^2}{r^2 f} - \frac{m_0^2}{f}}. \quad (12)$$

بنابراین، معادله هامیلتون-ژاکوبی در فضا-زمان سه بعدی با متریک 0 به طور کامل جداسدنی است. از آنجایی که سه ثابت حرکت C_T و C_φ و m_0 در سه بعد برای حل این معادله کافیست، این مسئله، حل پذیر است.

۳. معادله کلاین-گوردون

اگر به جای یک ذره از یک میدان اسکالار $\Phi(t, r, \varphi)$ به جرم M ، که در معادله کلاین-گوردون

$$\nabla^\mu \Phi = \frac{1}{\sqrt{-g}} \partial_\mu (\sqrt{-g} g^{\mu\nu} \partial_\nu) = M^2 \Phi, \quad (13)$$

صدق می‌کند، برای پیمایش گرفضا-زمان خمیده استفاده کنیم، اثر تقارن‌های آشکار و پنهان هندسه را در فضای فاز جواب‌های این معادله، مشاهده خواهیم کرد.

لازم به ذکر است که منظور از $\sqrt{-g}$ ، جذر قدر مطلق دترمینان متریک 0 است و مقدار آن با یک محاسبه ساده به دست می‌آید $\sqrt{-g} = r$.

بازنویسی معادله 0، نتیجه می‌دهد

$$\partial_r (rf \partial_r \Phi) + \frac{1}{r^2} \partial_\varphi^2 \Phi - \frac{1}{f} (\partial_t - \Omega \partial_\varphi)^2 \Phi = M^2 \Phi. \quad (15)$$

همانند ذره آزاد، برای میدان اسکالار نیز دو ثابت حرکت متناظر با تقارن‌های زمانی و سمتی وجود دارد. آن‌ها را به ترتیب معرفی ω و m می‌نامیم. سپس با پیشنهاد زیر برای میدان اسکالار

$$\Phi(t, r, \varphi) = e^{-i(\omega t - m\varphi)} R(r), \quad (16)$$

بخش زمانی و زاویه‌ای معادله 0 به راحتی از بخش شعاعی جدا می‌شوند و به صورت زیر در می‌آید

$$\partial_r (rf \partial_r R) + \left[\frac{(r^2 \omega + ab m)^2}{r^4 f} - \frac{m^2}{r^2} \right] R = M^2 R. \quad (17)$$

این رابطه نیز یک معادله دیفرانسیل معمولی برای $R(r)$ و علی‌الاصول قابل حل است. بنابراین معادله کلاین-گوردون روی هندسه سه بعدی با متریک 0، حل پذیر است.

خمیده مطالعه می‌نماییم. ثوابت حرکت آن‌ها، اطلاعات لازم در مورد تانسور کیلینگ و تقارن پنهان این سیاه‌چاله سه بعدی را در اختیار ما قرار می‌دهد.

۲. معادله هامیلتون-ژاکوبی

برای ذره آزادی به جرم m که روی مسیر زمان‌گونه حرکت می‌کند، معادله هامیلتون-ژاکوبی به صورت

$$p^2 = g^{\mu\nu} p_\mu p_\nu = -m^2, \quad (5)$$

برقرار است (p_μ تکانه ذره می‌باشد). در اینجا فضا-زمان خمیده‌ای را که ذره که روی آن حرکت می‌کند، سیاه‌چاله سه بعدی در نظر می‌گیریم [۴]. متریک این سیاه‌چاله به صورت

$$ds^2 = -f(r) dt^2 + \frac{dr^2}{f(r)} + r^2 (d\varphi + \Omega(r) dt)^2, \quad (6)$$

نوشته می‌شود که در آن، توابع (r) و $(\Omega(r))$ به صورت زیر داده می‌شوند

$$f(r) = \frac{(r^2 - a^2)(r^2 - b^2)}{\ell^2 r^2}, \quad (7)$$

$$\Omega(r) = -\frac{ab}{r^2 \ell}. \quad (8)$$

در اینجا، a و b به ترتیب شعاع افق‌های داخلی و خارجی هستند و ℓ شعاع فضای پاد-دسیته است. در ادامه فرض می‌کنیم $\ell = 1$. همچنین از نوشتن صریح تابعیت r در توابع متریک خودداری می‌کنیم. برای ساده‌سازی معادله 0، به معکوس متریک بالا، نیاز داریم که در اینجا آن را ارائه می‌دهیم

$$(\frac{\partial}{\partial s})^2 = -\frac{1}{f} (\partial_t - \Omega \partial_\varphi)^2 + f \partial_r^2 + \frac{1}{r^2} \partial_\varphi^2. \quad (9)$$

با استفاده از این نتیجه در معادله 0 داریم،

$$-\frac{1}{f} (p_t - \Omega p_\varphi)^2 + f p_r^2 + \frac{1}{r^2} p_\varphi^2 = -m^2. \quad (10)$$

با توجه به این‌که فضا-زمان مورد بحث دارای تقارن زمانی و سمتی است، بردارهای کیلینگ مربوط به تقارن‌های یاد شده یعنی ∂_t و ∂_φ به ترتیب، به ثوابت حرکت

$$C_T = p_t, \quad C_\varphi = p_\varphi, \quad (11)$$

که همان ارزشی و تکانه زاویه‌ای ذره هستند، منجر می‌شوند.

به این ترتیب، معادله 0 را می‌توان ساده کرد

۴. نتیجه‌گیری

در بخش‌های قبل، دو پیمایش‌گر ذره آزاد و میدان اسکالار را روی فضازمان سه‌بعدی سیاهچاله چرخان مطالعه کردیم و مشاهده کردیم که معادله حرکت هر دو آنها حل‌پذیر است. در مورد ذره آزاد این حل‌پذیری با وجود ثوابت حرکت انرژی و تکانه زاویه‌ای و جرم، واقع شد. دو ثابت اول از بردارهای کیلینگ مربوطه، از رابطه **۰** بدست می‌آیند. در حالی که در مورد جرم وضعیت کمی متفاوت است، طبق رابطه **۰** این ثابت حرکت متناظر با تانسور کیلینگ است. در نتیجه هیچ‌یک از ثوابت حرکت از تانسور مرتبه دوم غیربدهی‌یابی نمی‌آیند. در مورد میدان اسکالار نیز وضعیت به همین ترتیب است. بنابراین، این هندسه تانسور کیلینگ مرتبه دوم غیربدهی‌یابی ندارد. از طرفی می‌توان این بدیهی بودن تانسور کیلینگ مرتبه دوم را به‌گونه دیگر نیز مشاهده کرد. معادله **۰** را می‌توان بر حسب کازیمیر مرتبه دوم گروه $SL(2,R)$ نوشت. مولدهای این گروه به این صورت

$$A_{\pm} = \frac{1}{2(a+b)} (-\partial_t + \partial_\phi),$$

$$A_{\pm} = e^{\pm(a+b)(t-\phi)} \left(-\frac{(a^r + b^r + ab - r^r)}{2(a+b)\sqrt{r^r f(r)}} \partial_\phi \right. \\ \left. \pm \frac{\sqrt{f}}{2} \partial_r - \left[\frac{ab + r^r}{2(a+b)\sqrt{r^r f}} \right] \partial_t \right),$$

مراجع

1. V Arnold, “Mathematical Methods of Classical Mechanics,” Graduate Texts in Mathematics. Vol. 60. Translated by K Vogtmann, A D Weinstein, (2nd ed.), New York: Springer-Verlag (1978).
2. B Carter, “Global structure of the Kerr family of gravitational fields,” Phys. Rev. 174 (1968) 1559–1571.
3. V Frolov, P Krtous and D Kubiznak, “Black holes, hidden symmetries, and complete integrability,”; Living Rev. Rel. 20, no.1, 6 (2017).
4. M Banados, C Teitelboim, J Zanelli, “The Black hole in three-dimensional space-time,” Phys. Rev. Lett. 69 (1992) 1849-1851.
5. D Birmingham, I Sachs, S Sen, “Three-dimensional black holes and string theory,” Phys. Lett. B 413 (1997) 281-286.