

fcc-C_x

sjalali@phys.ui.ac.ir :

(دریافت مقاله: ۱۳۸۸/۶/۳؛ دریافت نسخه نهایی: ۱۳۸۹/۵/۱۰)

fcc-C@C_x

fcc-C_x

C_x


Wien2k PBE_GGA C_x fcc-C_x :

ترانزیستورها، محدودکننده‌های اپتیکی و غیره از این دسته مواد گزارش شده است [۷]. اما مطالعات نظری به دلیل مشکلات بسیار زیاد در تولید انبوه نمونه‌های خالص منزوی، نقش بسیار مهمی را در بررسی ویژگی‌های ساختاری و الکترونی فولرن‌ها با آلاییدگی درون وجهی و پیش‌بینی مشخصه‌های برجسته این دسته از مواد دارند [۸]. از این رو، روش‌های نظری و تجربی مختلفی برای مطالعه خواص ساختاری و الکترونی فولرن‌ها و مشتقاش تا کنون استفاده شده است. با این حال، تا آنجا که ما بررسی کردیم، می‌توان گفت که بر روی ایجاد آلاییدگی درون‌وجهی با خود اتم‌های کربن در فولرن‌ها آن هم در ساختار بلوری مطالعه‌ای صورت نگرفته است. ساختار مدنظر ما بیست و وجهی برشیده شده ^۱ C_x شامل بیست و شش ضلعی و دوازده پنج ضلعی می‌باشد. مولکول‌های ^۲ C_x در دمای اتاق ساختار بلوری fcc تشکیل می‌دهند. تقارن هندسی و

از زمان کشف فولرن‌ها [۱] و سنت آنها در مقیاس ماکروسکوپی [۲]، پژوهش‌های علمی متعددی بر روی برهم‌کنش قفس فولرنی با اتم‌های خارجی انجام شده است. از آن‌جا که شعاع مولکول ^۳ C_x تقریباً ۳/۵ آنگستروم است، بسیاری از اتم‌ها و مولکول‌های کوچک را می‌توان درون این مولکول کروی جا داد. La اولین اتمی بود که در قفس ^۴ C_x گیر افتاد [۳]. پس از آن، بسیاری از فولرن‌های آلاییده درون وجهی با اتم‌های فلزی و غیر فلزی با استفاده از روش‌های متفاوت تولید شده‌اند [۴]. فولرن درون‌وجهی به دلیل ساختار منحصر به فرد و کاربردهای گسترده از جمله ویژگی‌های اپتوالکترونیکی ^۱، داروسازی هسته‌ای و ابرسانایی، بسیار مورد توجه است [۴-۵]. کاربردهای بسیار دیگری نیز در زمینه‌های مواد فرومنظریس نرم، رساناهای آلی سه‌بعدی، روان‌کننده‌ها،

۱. Truncated icosahedron

۲. Optoelectronic

شکل ۱. شکافتگی تراز انرژی $= 1$ تحت پتانسیل تقارنی بیست وجهی [۱۳]

حالات‌های الکترونی این امکان را می‌دهند که با هارمونیک‌های کروی برچسب زده شوند [۱۱]. در ساده‌ترین مدل، الکترون‌های π درون C_6 به وسیله توابع موج هارمونیک کروی که کمی با تقارن I_h تعریف می‌شوند، توصیف شده‌اند. برای جا دادن σ الکترون π بر اساس اصل طرد پاولی و قاعده هوند، ترازهای انرژی از $= 1$ تا $= 1$ کاملاً پر شده‌اند ولی بالاترین تراز یعنی $= 5$ ، ده الکترون جفت نشده دارد در حالی که مولکول C_6 خالص پایدارترین مولکول در طبیعت است و هیچ الکترون جفت نشده‌ای در ساختار خود ندارد. اشکال کار اینجاست که تقارن بیست وجهی را به تقارن کامل کروی ساده‌سازی کرده‌ایم. این موضوع در شکل ۱ نشان داده شده است. در سال‌های اخیر، با توجه به مشکلاتی که این ساده‌سازی‌ها به وجود می‌آورده، نظریه تابعی چگالی [۱۲] که برای اولین بار توسط کان و شم ارائه شد، به روشی محبوب در شیمی و فیزیک کوانتومی برای محاسبات ساختار الکترونی مولکول‌ها و ساختارهای بزرگ تبدیل شده است [۱۳]. با استفاده از این نظریه دیگر نیازی به ساده‌سازی‌هایی که در مقالات گذشته صورت گرفته است نداریم و امیدواریم که خطاهای ناشی از این ساده سازی‌ها نیز تصحیح شود. نکته‌ای که در مورد این ساختار ویژه باید خاطر نشان کنم این است که پایه‌های بلوری ما در اینجا اتم‌ها نیستند بلکه خوشه‌های کربنی بزرگ‌اند. بنابراین بررسی خواص ساختاری و الکترونی این بلور آن هم در حضور ناخالصی مستلزم صرف زمان محاسباتی قابل توجهی است.

محاسبات خودسازگار خود را با استفاده از کد محاسباتی

ساختار قفسی این مولکول ویژگی‌های منحصر به فردی را برای این نیمرسانا به وجود آورده است. ما در این پژوهش، در ادامه مطالعات قبلی [۱۰] با کمک نظریه تابعی چگالی به بررسی و شبیه‌سازی خواص ساختاری بلور آلاییده C_6 پرداخته‌ایم.

مولکول C_6 الکترون ظرفیت دارد. هر اتم کربن، سه پیوند سیگما با سه اتم دیگر مجاور خود ایجاد می‌کند. بنابراین 180° الکترون در این پیوندهای سیگما شرکت دارند. انرژی این 180° الکترون بسیار کمتر از سطح فرمی است. این پیوندها به ساختار تعادل می‌بخشنده ولی در رسانش هیچ نقشی ندارند. 60° الکترون باقی‌مانده دور تا دور مولکول پراکنده شده‌اند. این الکترون‌ها درون اوربیتال‌های π کربن-کربن که از نظر پیوند بسیار ضعیف‌تر از پیوندهای σ هستند، قرار دارند. این اوربیتال‌ها با وجود دو تفاوت عمده شبیه به اوربیتال‌های π صفحه گرافن هستند. اولین تفاوت در این است که سه پیوند اتم کربن در مولکول C_6 روی یک صفحه قرار ندارند. در گرافن احتمال قرار گرفتن الکترون‌ها در زیر و بالای صفحه پیوند یکسان است ولی در فولرن‌ها، الکترون‌های π بیشترین زمان خود را در بیرون توب مولکولی به سر می‌برند. دومین تفاوت در غیر یکنواخت بودن طول پیوندهای کربن-کربن C_6 است. الکترون‌های π حول شش اتم کربن سازنده یک شش ضلعی مانند بنزن و گرافیت کاملاً غیرجایگزینه نیستند و به مولکول چسبیده‌اند.

برای یک مولکول کاملاً کروی، می‌توان از هارمونیک‌های کروی برای پیش‌بینی ترازهای انرژی الکترونی استفاده نمود. در مدلی بسیار ساده، طبیعت کروی مولکول‌های C_6 به

این خوشة منحصر به فرد در پژوهش‌های قبلی [۱۰] به دقت بررسی شده است.

C_{6} .

در سال ۱۹۹۱ ژنگ و همکارانش با استفاده از اندازه‌گیری NMR مشاهده کردند که مولکول‌های C_{6} در دمای اتاق با سرعت زیاد می‌چرخند [۱۹]. نوع و جهت این چرخش بسته به دما تغییر می‌کند. تغییر محور دوران و سرعت دوران مولکول‌ها، ساختار بلوری ما را تغییر می‌دهد. در مولکول، اندازه دو طول پیوند تنها درجه‌های آزادی دستگاه هستند، ولی در بلور C_{6} آزادی انتخاب شبکه براوه، آرایش فضایی و تعداد خوشه‌های موجود در سلول اولیه و همچنین تغییر شکل خوشه ناشی از میدان بلوری را داریم [۱۷].

بر اساس آنچه در تجربه مشاهده شده است، در دمای اتاق مرکزهای مولکولی به گونه‌ای در جایگاه‌های شبکه fcc قرار گرفته‌اند که چهار مولکول در یاخته بسیط fcc داشته باشیم. از آنجا که مولکول‌ها سریعاً حول مرکزهای جرم خود می‌چرخند، هیچ نظم چرخشی‌ای وجود ندارد و درست به همین دلیل همه مولکول‌ها از نظر تقارنی با هم معادلند. به عبارتی، در ابر ساختار بلوری C_{6} ، هر خوشه در مکان‌های fcc قرار گرفته‌است و گروه فضایی $Fm\bar{3}m$ را به وجود شبکه C_{6} محاسبات دقیق ابتدا به ساکن^۱ در ابعاد نانو برای ابر ساختار $Fm\bar{3}m$ به دلیل وجود ۲۴۰ اتم در هر یاخته بسیط، بسیار سنگین و گران قیمت است.

در این پژوهش ما برای به دست آوردن شرایط ذکر شده، پس از تعیین جهت‌گیری درست در ساختار بلوری، با واهش نیروهای میان اتم‌ها تا 1 mRy/Bohr مکان‌های تعادلی اتم‌های کربن را در ساختار بلوری خالص $\text{C}_{\text{6}}\text{-}\text{fcc}$ به دست آورده‌ایم (جدول ۱). سلول واحد ساختار بلوری به دست آمده با کمک نرم افزار xcrystden در شکل ۲ نشان داده شده است. در ساختار بلوری خالص $\text{C}_{\text{6}}\text{-}\text{fcc}$ ، دیگر تمام اتم‌های کربن هم‌ارز نیستند. بلکه در هر خوشه سه دسته اتم‌های غیر هم‌ارز داریم.

WIEN2K [۱۴] بر پایه نظریه تابعی چگالی و پتانسیل کامل انجام داده‌ایم. برای حل معادلات کان-شم [۱۲] حاکم بر مسئله از روش امواج تخت بهبود یافته با اوربیتال‌های موضعی برای الکترون‌های ظرفیت و شبیه مغزه (APW+lo)، با استناد به اینکه این روش برای موادی که کره موافقین تین کوچکی دارند پیشنهاد شده است [۱۵] و ما نیز در اینجا کره موافقین تین کوچکی داریم، استفاده کرده‌ایم. برای محاسبه پتانسیل تبادلی-همبستگی از تقریب شبیه تعمیم‌یافته (PBE-GGA) [۱۶] استفاده نموده‌ایم. برای بررسی ویژگی‌های ساختاری بلور خالص $\text{C}_{\text{6}}\text{-}\text{fcc}$ با ثابت شبکه 26.777 a.u. ۲۶ شاع قطع توابع موج در ناحیه بین جایگاهی، RK_{\max} ، را مساوی ۶ قرار داده‌ایم. G_{\max} را نیز ۱۶ اختیار کرده‌ایم. در ناحیه اول بریلوین ۶۴ نقطه شبکه وارون را برگزیده‌ایم که به دلیل تقارن به ۸ تقلیل داده شده است. پس از آن، برای بررسی ویژگی‌های ساختاری بلور آلاییده $\text{C}_{\text{6}}\text{-}\text{fcc-C@C}$ با توجه به اندازه اتم کربن و فضای خالی درون قفس مولکولی، ثابت شبکه را با مقدار ثابت شبکه مربوط به بلور خالص برابر گرفته‌ایم. از آنجا که قصد بررسی تغییرات ساختاری بلور آلاییده شده را داشته‌ایم تلاش کرده‌ایم تا آنجا که ممکن است جزیيات محاسباتی با آنچه که برای بلور خالص در نظر گرفته شده بود یکسان باشد. ضمناً، تا آنجا که ما بررسی کرده ایم تا کنون اکثر محاسبه‌ها و مطالعه‌ها بر روی این ساختار با استفاده از کدهای شبیه پتانسیل و بر روی کلاستر C_{6} نزوى صورت گرفته است.

C_{6} .


اتم‌های کربن در خوشه C_{6} دارای تقارن I_h می‌باشند. از نظر تقارنی تمامی اتم‌های کربن درون خوشه منزوی با هم هم‌ارزند. اتم‌های کربن در این خوشه دو نوع پیوند مختلف تشکیل می‌دهند که یکی از آنها، پیوندهای دوگانه‌ای با اندازه $1/38$ آنگستروم هستند و شش ضلعی‌های مجاور موجود در C_{6} را به هم پیوند می‌دهند و دیگری از نوع پیوندهای یگانه‌اند که سبب اتصال شش ضلعی و پنج ضلعی‌های موجود در این خوشه می‌شوند و طول آنها $1/44$ آنگستروم می‌باشد [۱۷]. تقارن‌های

۱. Ab initio

جدول ۱. مقایسه طول پیوند محاسبه شده در دو ساختار خالص و آلاییده در ساختار بلوری با نتایج محاسباتی و تجربی دیگران.

| طول پیوند Å | [APW+lo](PBE-GGA) محاسبات ما | [۱۷] NMR | [۱۷] X ray data | [۱۷] Gaussian orbital LDA |
|-------------------------------------|---------------------------------|----------|-----------------|---------------------------|
| پیوند یگانه C_6C_6 | ۱/۴۷[۲] | ۱/۴۶ | ۱/۴۵۵ | ۱/۴۵ |
| پیوند دوگانه C_6C_6 | ۱/۴۱[۲] | ۱/۴۰ | ۱/۳۹۱ | ۱/۳۹ |
| پیوند یگانه fcc-C@C_6 | ۱/۴۴۲ | - | - | - |
| پیوند دوگانه fcc-C@C_6 | ۱/۳۹۸ | - | - | - |

پوسته قرار بگیرد) و رایج‌ترین آنها ناخالصی برون‌وجهی^۳ (که در آن ناخالصی بین پوسته‌های فولرن و در مکان‌های بین جایگاهی شبکه قرار بگیرد) می‌شوند. این سه نوع آلاییدگی در شکل ۳ نشان داده شده است. همان‌گونه که در شکل مشاهده می‌شود در دو ردیف اول تصویر، جایگاه‌های چهاروجهی و هشت‌وجهی اتم‌های آلاییده برون‌وجهی در یاخته واحد C_6C_6 در دو یاخته مشابه نشان داده شده‌اند [۲۰]. این دو ردیف نمایشگر حالت‌های مختلف ایجاد ناخالصی برون‌وجهی می‌باشد. سطر اول، یاخته واحد مکعبی را نشان می‌دهد و سطر دوم مریبوط به یک ساختار چهاروجهی است که برای تفهیم بهتر ساختار مکعبی آورده شده است. A. نماینده فلزات قلیایی است که به عنوان آلاییدگی در جایگاه‌های چهار وجهی و هشت‌وجهی قرار گرفته است. در سطر سوم از سمت راست آلاییدگی جانشینی را مشاهده می‌کنیم. در این نوع آلاییدگی، اتم ناخالصی جانشین یکی از کربن‌ها در ساختار قفسی فولرن می‌شود. در همین سطر از سمت چپ، آلاییدگی درون وجهی نشان داده شده است. در این نوع آلاییدگی، اتم ناخالصی درون قفس کربنی گیر افتاده است. فولرن‌های آلاییده در فاز بلوری را فولراید^۴ می‌گویند ولی به فاز بلوری خالص فولرن، فولرایت^۵ گفته می‌شود. اطلاعات ساختاری خیلی کمی در رابطه با فاز بلوری آلاییده درون وجهی یا جانشینی



شکل ۲. سلول واحد ساختار بلوری خالص C_6C_6 که با استفاده از وضعیت‌های فضایی تولید شده و به کمک نرم‌افزار xcrysden [۱۸] رسم شده است.

پیوند بین خوش‌های C_6C_6 در ساختار بلوری از نوع پیوندهای مولکولی ضعیف است ولی باید توجه داشت که پیوند میان مولکول‌های C_6C_6 در مقایسه با پیوند واندروالسی صفحات گرافیت بسیار قوی‌تر است [۱۹].

فولرن‌ها به دلیل توانایی آلاییدگی به روش‌های گوناگون بسیار مورد توجه‌اند. این آلاییدگی‌ها شامل ناخالصی درون‌وجهی^۶ (به گونه‌ای که ناخالصی درون پوسته فولرن قرار بگیرد)، ناخالصی جانشینی^۷ (به گونه‌ای که ناخالصی به جای یک اتم کربن روی


^۳. Exohedral doping

^۴. Fulleride

^۵. Fullerite

^۶. Endohedral doping

^۷. Substitutional doping



شکل ۳. سطر اول و دوم آلاییدگی به روش برونوجهی را نشان می‌دهد. در سطر سوم از سمت راست آلاییدگی به روش جانشانی و از سمت چپ آلاییدگی به روش درون وجهی را مشاهده می‌کنیم.


آنچه که در دمای اتاق مشاهده شده است را مورد بررسی قرار بدهیم. با وارد کردن اتم ناخالصی به درون مولکول C_60 ، واحد مولکولی جدیدی خواهیم داشت که به آن endofullerene می‌گویند [۲۱]. از همان زمان که این مولکول توسط کروتو کشف شد فرضیه وجود ناخالصی درون وجهی، توسط خود کروتو و همکارانش مطرح شد. البته پیشرفت کندی که در زمینه تکنولوژی تولید و خالص‌سازی این نوع ناخالصی‌ها وجود داشته سبب شده است که به نسبت دیگر روش‌های آلاییدن، پژوهش‌های کمتری در این زمینه داشته باشیم [۲۲]. در ناخالصی درون وجهی باید به اثر برهم‌کنش الکترونی توجه بیشتری نمود. قرار دادن یک، دو یا سه اتم فلزی درون فولرن بسیار رایج است، تا چهار اتم هم گزارش شده است ولی در مورد ناخالصی‌های گروه چهارم جدول مندیف، خصوصاً از جنس خود کربن مطالعات زیادی صورت نگرفته است. علت اصلی جذابیت ناخالصی اتم کربن، توانایی این اتم در ایجاد پیوندهای بسیار متفاوت و ارزانی آن جهت ساخت مواد است. قدم اول برای مطالعه ویژگی‌های فیزیکی این ساختار، بررسی هندسی ساختار بلوری و به دست آوردن وضعیت مکانی اتم

وجود دارد. بیشترین پژوهش‌ها بر روی فاز بلوری با ناخالصی برون وجهی فلزات قلایی است.

ما در این پژوهش، آلاییدگی‌ها را بر اساس وضعیت مکانیشنان نسبت به پوسه مولکول C_60 طبقه‌بندی کردیم. از آنجا که بلور خالص، انتقال بار را کنترل کنیم. این انتقال بار با افزایش ناخالصی، انتقال بار را کنترل کنیم. این انتقال بار باعث می‌شود که الکترون‌ها از ناحیه زیر سطح فرمی به ترازهای رسانش انتقال یابند. اما در عین حال، با حضور ناخالصی، ساختار بلوری می‌تواند در همان جایگاه‌های شبکه باقی بماند و یا اینکه ساختار تغییر کند. این تغییر ساختار شبکه ناشی از کشش و فشاری است که اتم‌های ناخالصی جدید به شبکه وارد می‌کنند.

fcc-C@C_6 .

می‌دانیم که آلاییدگی‌ها و نقص‌ها در شبکه، ویژگی‌های مواد را بسیار تحت تأثیر قرار می‌دهند. با توجه به مروری که بر انواع ساختارهای آلاییده شبکه بلوری C_60 داشتیم، بر آن شدیم تا اثر آلاییدگی درون وجهی اتم کربن در ساختار بلوری‌ای مطابق




شکل ۴. یاخته واحد بلور C_60 fcc- C_60 که ما در محاسباتمان استفاده نموده‌ایم و با نرم‌افزار xrysden [۱۸] رسم شده است.

دادن آلاییدگی درون مولکول، تقارن‌های مولکولی و بلوری تغییر خواهد کرد. بنابراین انتظار داریم که عملگرهای تقارنی به شدت کاهش یابند. به همین دلیل در بلور آلاییده، سی و سه دسته اتم کربن غیر همارز داریم. تقارن وارونی نیز از بین می‌رود. از این رو حجم محاسبات به شدت افزایش می‌یابد و مجبوریم با ماتریس‌های چگالی فوق العاده بزرگی محاسباتمان را ادامه بدھیم.

fcc- C_60 .

پس از واهلش اتم‌های کربن با حضور آلاییدگی درون ساختار قفسی، محاسبات خود را برای بلور C_60 fcc- C_60 انجام دادیم. همان‌گونه که در جدول ۱ مشاهده می‌کنید اندازه پیوندهای یگانه و دوگانه را برای ساختار آلاییده شده نیز محاسبه کردہ‌ایم. با توجه به آنچه که به دست آمده می‌بینیم که با حضور ناخالصی درون وجهی کربن در جایگاه مذکور طول پیوندهای یگانه و دوگانه برای قفس مولکولی در ساختار بلوری کاهش یافته است. با بررسی دقیق‌تر متوجه می‌شویم که اختلاف طول این دو پیوند نیز از 0.06 \AA به 0.044 \AA کاهش یافته است. این کاهش اختلاف در طول پیوندهای یگانه و دوگانه برای ناخالصی برونو وجهی نیز توسط سیتو و همکارانش [۲۳] در شکل ۵ مشاهده شده است. در ناخالصی برونو وجهی A_nC_60 الکترون‌هایی که در اثر ورود ناخالصی به پوسته مولکولی منتقل می‌شوند سبب تغییر شکل یافتن زاویه پیوند حلقه پنج‌ضلعی می‌گردند. این امر سبب کاهش اختلاف میان پیوندها می‌گردد. در ساختار درون وجهی



شکل ۵. طول پیوند بر حسب بارهای انتقال داده شده به پوسته C_60 در ساختار بلوری آلاییده A_nC_60 . طول پیوند پنج ضلعی - شش ضلعی (یگانه) با مریع نشان داده شده و طول پیوند شش ضلعی - شش ضلعی (دوگانه) با دایره نشان داده شده است [۲۳].

ناخالصی درون قفس مولکولی C_60 است. محاسبات ما برای ساختاری که اتم کربن در نزدیکی مرکز وجهه شش ضلعی در امتداد خط واصل مرکز بیست وجهی به مرکز شش ضلعی قرار دارد، انجام شده است. شایان ذکر است که مکان دقیق ناخالصی را نداشتیم و از این رو مختصاتی فرضی نزدیک مرکز شش ضلعی به سمت مرکز بیست وجهی انتخاب نمودیم. سپس با توجه به این که تمام اتم‌ها در ساختار بلوری $1 \text{ mR}/\text{Bohr}$ تا 1 \AA واهلش یافته‌ند، مکان دقیق ناخالصی برابر با $1/23998 \text{ \AA}$ آنگستروم تعیین شد. یاخته واحد نهایی به دست آمده که با نرم‌افزار xrysden [۱۸] رسم شده است در شکل ۴ نشان داده شده است. با قرار

می‌کنیم که طول پیوندهای یگانه و دوگانه در بلور آلاییده نسبت به بلور خالص کاهش یافته است. در واقع اختلاف طول این دو طول پیوند از \AA 0.06 ± 0.04 به 0.06 ± 0.04 کاهش یافته است. با وجود پیوندهای π موجود در مولکول C_{60} ، کاهش در طول پیوند را می‌توان ناشی از اثر تغییر پیوند^۱ یا اثر کاهش تقارن در مولکول C_{60} دانست. وقتی مقدار بار الکترونی در درون C_{60} افزایش می‌یابد اثر تغییر پیوند نیز کاهش می‌یابد. کاهش اثر تغییر پیوند مانع افزایش انرژی الکترون‌های π در نزدیکی سطح فرمی می‌شود. از این رو، با افزایش مقدار بار برابر روی پوسته C_{60} طول پیوند یگانه نیز کاهش می‌یابد [۲۳]. به عبارتی توزیع بار جدیدی به وجود می‌آید که خواص الکترونی جدیدی را برای ساختار مابه وجود خواهد آورد. این پدیده برای دیگر ساختارها می‌تواند نتیجه ایجاد توزیع بارهایی است که خواص مورد نیاز ما را تأمین می‌کنند. امروز، مطالعه رسانش الکترونی ابزار نانو در مقیاس اتمی و مولکولی از لحاظ پژوهشی و صنعتی بسیار مورد توجه است.

از دانشگاه اصفهان به خاطر حمایت‌هاییشان سپاسگزاری می‌نماییم. مولف دوم، س.ج.ا.، از مرکز ابررایانه نانوفناوری محاسباتی وابسته به پژوهشکده علوم نانو - پژوهشگاه دانش‌های بنیادی (IPM) نیز قدردانی می‌کند.

7. I Yanov and J Leszczynski, *J. Mol. Graphics Modell.* **19** (2001) No. 2, 232.
8. H Shimotani, T Ito, Y Iwasa, A Taninaka, H Shinohara, E Nishibori, M Takata, M Sakata, *J. Am. Chem. Soc.* **126** (2004) 364.
9. A B Harris, and R Sachidanandam, *Physical Review B* **46**(8) (1992) 4944.
۱۰. سمانه جوانبخت، سعید جلالی اسدآبادی، مجله پژوهش فیزیک ایران، **۹** (۱۳۸۸) (۲).

^۱. Bond alternation effect

نیز تقارن توزیع بار الکترونی در ساختار قفسی تغییر شکل پیدا می‌کند و کاهش تقارن بار سبب تغییر اندازه پیوندها و کاهش اختلاف آنها می‌شود. توزیع جدید ابر الکترونی سبب می‌شود که ویژگی‌های الکترونی جدیدی را مشاهده کنیم. با بررسی ترکیبات برون وجهی دیگر، در مقاله ونگ و همکارش [۲۴] مشاهده کردیم که با قرارگرفتن اتم خارجی فلزی در مکانی دور از مرکز، یک گشتاور دوقطبی الکتریکی دائمی درون C_{60} القا می‌شود؛ پس در ساختار حجمی به دلیل وجود یک یون محصور شده در قفس مولکولی، انتظار مشاهده خواص فروالکتریکی را خواهیم داشت. البته با توجه به مطالعات اندرونی و همکارش [۲۵] بسته به اندازه و میزان رسانش اتم خارجی، وضعیت اتم تا مرکز شش وجهی متفاوت است و واضح است که متقابلاً اثر آن نیز بر روی الکترون‌های π قفس متفاوت خواهد بود. ما در ادامه کار، در حال مطالعه نحوه توزیع الکترونی جدید در ساختار آلاییده C_{60} هستیم.

ما در ابتدا طول پیوندها را برای ساختار مولکولی خالص PBE-GGA پس از واهلش اتم‌های کربن با کمک تقریب PBE-GGA به دست آورده‌ایم. نتایج ما همان‌طور که در جدول ۱ نمایش داده شده است با نتایج تجربی سازگاری بسیار خوبی دارد [۱۰]. سپس مکان تعادلی ناخالصی اتم کربن درون خوش‌های C_{60} را با واهلش مجدد ساختار بلوری آلاییده به دست آورده‌ایم. در بررسی ساختار مولکولی در جدول ۱، مشاهده

1. H W Kroto, J R Heath, S C O'Brien, R F Curl, R E Smalley, *Nature* **318** (1985) 162.
2. W Kraitschmer, L D Lamb, K Fostiropoulos, D R Huffman, *Nature* **347** (1990) 354.
3. J R Heath, S C O'Brien, Q Zhang, Y Liu, R F Curl, H W Kroto, F K Tittel, R E Smalley, *J. Am. Chem. Soc.* **107** (1985) 7779.
4. S Guha, K Nakamoto, *Coordination Chem. Rev.* **249** (2005) 1111.
5. A Khong, R J Cross, M Saunders, *J. Phys. Chem. A* **104** (2000) 3940.
6. A Gromov, D Ostrovskii, A Lassesson, M Jonsson, E E B Campbell, *J. Phys. Chem. B* **107** (2003) 11290.

18. A kokalj, *Comp. Mat. Sci.* **28** (2003) 155,
<http://www.xcrysden.org>.
19. A Oshiyama, S Saito, N Hamada, Y Miyamoto, *J. Phys. Chem. Solids*, **53** (8011) (1992) 1457.
20. L Forro and L Mihaly, *Rep. Prog. Phys.* **64** (2001) 649.
21. D S Bethune, R D Johnson, J R Salmen, M S Devrise, and C S Yanoni, *Nature*, London, **366** (1993) 123.
22. H W Kroto, J R Health, S C O'Brien, R F Curl, and R E Smalley, *Nature*, London, **318** (1985) 162.
23. R Saito, G Dresselhaus and M S Dresselhaus, *Chem. Phys. Lett.* **210** (1993) 159.
24. Y Wang, and D Tomanek, *Chem. Phys. Lett.* **208** (1,2) (1993)79.
25. W Andreoni, and A Cueioni, *Appl. Phys. A* **66** (1998) 299.
11. M L Cohen, V H Crespi, W E Billups, A Ciufolini (Eds.), *Buckminsterfullerenes*, VCH Publishers, (1993) 197.
12. W Kohn, and L J Sham, *Phys. Rev. A* **140** (1965) 1133.
13. S Guhaa, K Nakamoto, *Coord. Chem. Rev.* **249** (2005) 1111.
14. P Blaha, K Schwartz, G K H Madson, D Kvasanicka, J Luitz, "WIEN2K, An augmented plane wave + local orbitals program for calculating crystal properties", Tech. University Wien, Austria, (2001).
15. S Cottinear, "Density Functional Theory and the Family of (L)APW Methods:step by step introduction", Aug. 6 (2004) 10;
http://www.wien2k.at/reg_user/textbooks.
16. J P Perdew, K Bruke, M Ernzerhof, *Phys. Rev. L* **77** (1996) 3865.
17. N Troullier, and J L Martins, *Phys. Rev. B* **46** (1992) 1754.